

傷寒論後條辨

傷寒論後條辯卷之七

新安程應龍郊倩甫條註 門人王人鳳翔下校

○辯陽明脉證篇第一

傷寒能使陽明爲病。則表邪歸裏。寒從熱化。最爲  
佳兆。何以言之。風寒濕熱。在表之邪。流爲壞病。變  
徙無窮者。總因熱從外轉。散漫無歸之故。一得約  
束歸中。前無去路。任爾窮山蕩海之寇。直從簞穀  
下擒奪之。無餘力。何快如之。若然者。自非本熱標  
寒。陽神素盛者。不能轉邪歸我也。陽盛者。其人少  
水。多火。雖他經受邪。無關於胃。而胃中燥熱之氣。

氣者皆能令  
轉。陽明為  
物所壅故也  
事。理。不。知。差  
難。不。難。方。可  
定。胃。之。寢。與  
不。寢。故。來。路  
不。可。不。審。之  
又。審。

自。成。鬱。遏。所。以。一。經。汗。下。津。液。被。奪。則。在。表。之。邪。  
盡。成。收。斂。隨。燥。熱。而。內。結。此。之。謂。表。虛。裏。實。實。則。  
邪。無。去。路。故。可。任。攻。但。去。路。本。之。來。路。若。求。去。路。  
得。了。脫。須。是。來。路。討。分。明。當。於。併。合。病。間。窮。其。入。  
裏。有。盡。未。盡。之。辨。稍。一。帶。表。輕。非。可。攻。之。陽。明。裏。  
未。盡。實。故。也。裏。實。雖。已。屬。胃。顧。胃。中。燥。熱。之。邪。有。  
因。內。實。而。結。者。有。不。盡。因。內。實。而。結。者。此。則。不。復。  
從。來。路。討。分。明。而。併。欲。從。去。路。討。分。明。矣。仲。景。所。  
以。約。法。三。章。以。大。小。調。胃。三。承。氣。湯。應。付。二。陽。明。  
之。去。路。緣。陽。實。之。家。其。陰。必。虛。不。欲。以。溜。液。致。燥。

太陽之為病  
多從外入風  
寒等是病根  
陽明之為病  
多從內受胃  
家不和是病根

二百  
三六

陽明之為病胃家實也

之陽明奪血致燥之陽明混同於胃家實之陽明  
模稜處治也蓋胃為一身之主百病之來俱要陽  
明有擔當所稱五藏六府之海者不但無病之時  
宜寶重即有病之時宜顧惜人之於身能知陽明  
為六經之根柢而胃家實為陽明之根柢則卒病  
在乘斷無壞病之貽厥身矣

陽明之為病指府病而言可攻之陽明也胃家猶  
云濕家汗家之類兼素稟而言胃家實推原陽明  
受病之故較陽明之為病似先一層凡病在六經

而身之一字  
則又胃家定  
之病候也故  
下條指出三  
陽明來

二百  
三七

俱從陽明胃受氣其誤汗不至於亡陽動經誤下  
不至於結胸下利誤利小便不至於畜血便淋而  
因標轉本祇成其陽明之爲病者由其人胃家實  
也胃家實則和未至能却邪既至能容唯其能容  
是以可去仲景欲人鄭重於攻之一字故首條不  
揭病證祇揭病源不教人將陽明之爲病看左了  
并將陽明之爲病看忽了

傷寒三日陽明脉大

大爲陽盛之診傷寒三日見此邪已去表入裏而  
脉從陽熱化氣知三陽當令無復陽去入陰之懼

三家之成陽  
明病亦猶肺

矣。縱他部有參差。只以陽明胃脉為準。不言陰陽者。該及浮沉。具有實字之意。不實則為芤。為虛。表熱裏寒。大是假規模。便早為宅中計。凡下文云脉弱。脉遲。脉滑而疾。脉沉。脉浮而芤。而濇等類。皆貫此大字在內。只從有力無力上計分曉。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便。胃中燥煩熱。大便秘難是也。

陽明為病。本於胃家實。則胃實一家。可驗於未病。

家素有一過風  
 氣者一過風  
 家難病之來  
 肺病難作若  
 胃家不燥不  
 寢雖有陽明  
 病只是能食  
 者名中風不  
 能食者名中  
 寒病正一則  
 胃中虛冷自  
 召其外邪者  
 一則胃中乾  
 而白成胃結  
 亦有此非三  
 家之陽明  
 也  
 發汗利小便  
 是字謂會  
 犯上也非

先者故借問答從三陽中措出之脾約者小便數  
 而大便難腸胃素乘燥氣也胃家實者納多出少  
 腸胃素稱陽盛也發汗利小便已胃中燥煩熱大  
 便難者津液從前被奪腸胃素少血滋也三者皆  
 成陽燥凡陽盛者陰必虛陰虛者陽必奏所以病  
 在三陽若吐若下若發汗在他八則邪從外轉而  
 為壞病在我則邪從內轉而為府邪燥則召燥也  
 三陽明唯正陽陽明津血自足祇為火熱搏結成  
 實太陽陽明便屬失津成燥少陽陽明便屬少血  
 成燥結譫雖同而實處藏虛三承氣正從此處分

指日前說

別。至。於。津。液。暴。亡。亦。見。陽。明。胃。實。證。此。是。假。實。三。承。氣。另。當。斟。酌。矣。

傷寒脉浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也傷寒轉繫陽明者其人漉然微汗出也。

太陰何由轉  
屬陽明以其  
人脈浮緩手  
足自溫胃中  
陽氣旺即

陽明為病本於胃家實則凡胃家之實不特三陽受邪能致其轉屬陽明即三陰受邪亦能致其轉屬陽明耶舉太陰一經例之脉浮而緩是為表脉然無頭痛發熱惡寒等外證而只手足溫是邪不



以小便利則難曰陰經其燥氣向在胃耳

凡三陰轉屬陽明自是三陰證罷故太陰則濇微汗出少陰則口乾燥腹脹不大便厥陰則諸證也

在表而在裏但入裏有陰陽之分須以小便利之小便不利者濕蒸燔熱而發黃以其人胃中原來無燥氣也小便自利者胃乾便鞭而成實以其人胃中本來有燥氣也病雖成於七八日而其始證却脉浮而緩手足自溫則寔是太陰病轉屬來也既已轉繫陽明其脉之浮緩者轉為沉大不必言矣而手足之溫不止溫已也必濇然微汗出蓋陰證無汗汗出者必陽氣充於內而後溢於外其大便之實可知唯其從陰經轉來故汗雖出而仍微耳是之謂太陰陽明則桂之少陰三大承氣證

二百四十

病因屬內病  
發於外、現於  
所以發內也

反惡熱反字  
是與太陽制  
則表裏虛

陰一小承氣證。何非轉屬陽明之病哉。此證自  
太陰轉來。而本之小便自利。即太陽之脾約證。但  
以得之暴者為太陽。而以得之緩者為太陰。  
問曰。陽明病。外證云何。答曰。身熱。汗自出。不惡寒。反  
惡熱也。

胃家實。自是病因。非病證。陽明見證。究竟未經揭  
出。故復設此條之問答。以補之。身熱者。陽熱盛極。  
從胃而布於肌肉也。汗自出者。津液受熱。從胃而  
蒸出膚表也。不惡寒。反惡熱者。胃中陽亢。不得陰  
氣以和之。為燥熱所苦也。句中十二字。須一連讀。

陽明病  
病在表  
病在裏

初得陽明表  
氣被阻故亦  
有不發熱而  
惡寒證更  
即化熱亦邪  
不固未故也

二百四

二百四

下陽明胃實潮熱諸語等證不必盡現要未有不  
全此數證而得成其為陽明者因外以徵內因是  
答陽明府證然經病亦可兼看

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖  
得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

陽明惡寒終是帶表至於府病不唯不惡寒且惡  
熱表罷不罷須於此驗之故從反證以辯出然曰  
雖得之一日惡寒將自罷則已該夫陽明之不必  
轉得者

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸

不惡寒六經  
 唯陽明陽氣  
 所居最也邪  
 皆成此後氣  
 有寒而不甚  
 傳者此六  
 非太陽無幾  
 處其意未  
 歷胃無由  
 其義神妙

三百  
 四三

無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

六經雖分陰陽而半之者胃五藏六府皆朝宗而  
 稟令焉一有燥熱無論三陽傳來之表寒從而歸  
 熱即三陰未傳之陰寒亦歸而變熱純陽無陰故  
 曰萬物所歸無所復傳任爾寒熱方張一見陽明  
 自當革面故曰始雖惡寒二日自止末句亦非淺  
 結正見陽明關係之重視佳萬物所歸無所復傳  
 二句陽明以下法為正必五藏六府之和皆歸結  
 於此別無去路方是下證之陽明等閒莫教錯下  
 問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利

此亡津液四  
字當一頓  
中乾燥復折  
下來譯

小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。此名陽明也。

陽明之外證。已經辯明。而胃家實所以成陽明之故。尚未詳及。故問答復設及之。太陽病若發汗。若下。若利小便。皆為去邪而設。邪苟相當。即成解證。如其不解。徒亡津液矣。亡津液而不為壞病者。以其人胃中乾燥。能為燥邪淵藪。故津液一亡。太陽遂轉屬陽明也。特轉屬層次。不止有表罷不罷之辯。而表罷入裏。復有燥實燥不實之辯。所以有不更衣之陽明病。有內實之陽明病。有大便難之陽

明病也。○其次有屬表屬裏。○所以下法有禁宜。○受氣有裏實裏燥。○所以下法有大小。○本太陽病起至名陽明也。○止自是一氣說下。○而達迤分別多少。○置讀者當於此悟出。○太陽陽明轉屬褶疊處。○本太陽病初得時。○發其汗。○汗先出不徹。○因轉屬陽明也。

胃家有燥氣。○毋論病在太陽。○發汗吐下。○過亡津液。○能轉屬之。○即汗之一法。○稍失其分數。○亦能轉屬之。○微者盡也。○透也。○汗出不透。○則邪未盡出。○而辛熱之藥性。○反內留而助動燥邪。○因轉屬陽明。○辨脉篇所

云汗多則熱愈。汗少則便難者是也。

傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出漉漉然者。是轉

屬陽明也。

凡言轉屬者。皆是指其乘。便因勢之易。易也。其易易。太。謂其乘。便。

轉屬陽明之證。於何徵之。傷寒發熱無汗。嘔不能食。太陽本證現在。而反汗出漉漉然者。知大便已結燥於內。雖表證未罷。已是轉屬陽明也。漉漉連綿之意。俗云汗一身不了。又一身也。

二陽併病。太陽初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之為逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。

此陽明為入  
象之兩表  
不帶次病  
在轉手上中

陽氣怫鬱在表、當解之、熏之、若發汗不徹、不足言、  
氣怫鬱不得越、當汗不汗、其人躁煩、不知痛處、乍在  
腹中、乍在四肢、按之不可得、其人短氣、但坐、以汗出  
不徹故也、更發汗則愈、何以知汗出不徹、以脉濇故  
知也

太陽既轉屬陽明、宜可從陽明處治矣、而未也、正  
恐轉過之處、表邪去、尚未盡、裏邪乘其未去而已  
來、兩邪相持而前後互見、是曰併病、縱使表少裏  
多、終是帶表之陽明也、雖續得微汗出、不惡寒、滋  
倘其間尚帶一二分太陽表、當下不可下矣、下之



陽氣拂鬱不得越。是表陽。全在經發。汗不微。是表陽已半。汗微。二。有微。似之。據。故。汗。此以。助。按。

而表邪陷入。隨有結胸。協熱利等變。此之謂逆。仍須小發汗。併去未微之表。方可一意於陽明。設面色接連而赤。勢來方盛。此非發汗不微者比。陽氣經久不得發越。致怫鬱在表。因現於面耳。故不但用解劑。如大青龍輩。而且兼熏法。用麻黃等煎湯。從外蒸。以助其汗。所以然者。陽氣重故也。若發汗不微。陽氣已經汗越。何至怫鬱乃爾。自是當汗不汗。邪氣擁甚於經。漫無出路。故其人燥煩。不知痛處。乍在腹中。乍在四肢。究竟非實邪。故按之不可得。此自是太陽本經表氣盛實之證。併病中無此。

以原法知汗  
出者此可  
者正此可  
見此可  
者自是此  
脈大也

二百四十七

條中一可字  
二金李傳

也併病之連滯。僅於表病中增出短氣一證。便可  
坐以汗出不徹。其於陽氣拂鬱者不侔。則解之重  
之之法。一無可試。務更其大發汗之劑。為小發汗。  
斯為合法耳。脈滿。祇是營衛不流通而成滯。表陽  
已不甚盛也。設面色緣緣正赤。已下。俱是借陽氣  
拂鬱作客形。出汗不徹。所以小發汗之故。太  
陽不應有腹痛。以邪無出路。意欲內攻。故乍在仍  
不知其處。

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

九

陽明病三季  
言陽明病不  
可發汗如此  
之病則亦可  
發汗汗法為  
太陽此處  
發汗不特太  
陽病也陽明  
病亦宜  
陽中熱氣勝  
故大已全盛  
時宜見陽明  
病宜見熱屬  
虛汗和虛寒  
宜向年不得  
轉為發汗  
用桂枝麻黃

三  
九

陽明病、脈浮無汗而喘者、發汗則愈、宜麻黃湯。

既知併病有未盡之表、仍宜治表、則凡屬陽表之  
陽明、雖當視表邪所在之淺深以定法、不得以小  
發其汗一語混同治之矣、條中無一陽明證、云陽  
明病者、胃已實而不更衣也、陽明之脈必大、今却  
兼遲、兼浮、陽明之證不惡寒、法多汗、今尚微惡寒  
無汗而喘、是府中雖是陽明、而經中全是太陽、仍  
從解肌發汗例、治以桂枝麻黃二湯、經邪散而府  
中之壅滯亦通矣。

太陽與陽明合病者、必自下利、葛根湯主之。

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

合病之証凡太陽經之頭痛惡寒身重與陽明經之目赤口乾舌燥但見一証便是不必悉具并病亦如是仍須按脈治之

即此而推及於合病有此有彼俱不難準之以定治法太陽與陽明合病者太陽之惡寒發熱等証與陽明之喘滿胸滿等証同時均發無有先後也而陽交應驟盛於表則裏氣暴虛升降不及故不利則嘔治法只須解表表解而裏自和葛根湯從升利則主之嘔加半夏所以降也

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下麻黃湯主之

若前證不利不嘔乃喘而胸滿者則必表邪與經

張氏云曰陽  
受氣於胸中  
轉而胸約者  
陽氣不旺發  
寒而熱也

項背強兀兀  
者太陽之脈  
病而連及陽  
明之經也

二百五十三

二百五十三

之

太陽病項背強兀兀反汗出惡風者桂枝加葛根主  
氣互結而盛壅滯在上焦胃陽虛而無復升降也  
戒不可下者上壅而不順則下逆而不利可知經  
絡經表之邪過實主麻黃湯泄肺而通氣道隨其  
實而奪之表與經兩解則逆者降而胃亦和矣

太陽病項背強兀兀無汗惡風者葛根湯主之

項背強兀兀五字連續上半身成硬直之象太陽  
病有此經邪壅盛不盡在表可知經曰胸者背之  
府也府邪稍露端倪知勢已連及陽明故雖汗出

此條無咎  
利亦主葛根  
者邪在二  
陽之經下利  
者既非裏虛  
不利者亦非  
裏虛故用葛  
根者反為不

二百  
五十四

惡風之中風。即不得不於桂枝湯內加葛根。而無  
汗惡寒之傷寒。即不得不易麻黃湯為葛根湯矣。  
葛根能宣陽益陰。清解胃中邪熱。太陽藥中用之。  
所以達陽明而伐之於早也。

太陽病寸緩關浮。尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔。  
但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡  
寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞭。不更  
衣十日無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。  
渴者宜五苓散。

太陽陽明表有未罷。宜從證辨之矣。尤須辨其脈。

曰屬陽明已  
場胃失不成  
下。下。水。經  
汗。下。法。不  
泰。其。津。液。事  
理。終。不。結。寔  
陽。明。自。不。能  
成。其。為。陽。明  
也。

凡不更衣見  
有表證表臥  
則。消。潤。水  
法。不。致。成。症  
於。日。較。難。多  
總。無。誤。也。

如病在太陽得寸緩關浮尺弱之脉不為不如經也發熱汗出復惡寒不嘔表證現在不甚有關於裏也此而心下痞得之誤下太陽中自有成法可無議也至如痞證不因誤下而成考之外證復不惡寒而渴其為轉屬陽明無疑矣陽明而見寸緩關浮尺弱則為不及之診不及則小便數小便數則大便必鞭鞭因津液低滲所致非有實邪在胃雖不更衣十日總無熱攻腸胃或滿或堅之苦唯是津液不能上潮渴欲飲水但於與水間救之以法耳法者何不可不與不可多與也與後復渴者

可作微喘也

五言

水多則停也。則五苓散。又不在陽明禁例。所以然者。寸緩關浮尺弱。在太陽。為如經在陽明。為不及也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脉浮而緊。若下之。則腹滿小便難也。

不寧此也。又有陽明受病之時。兼其他經乘入者。其治法更難從陽明定例也。陽明中風。此風為邪風。該寒在內。謂經到陽明。重複中有表邪。故陽明之熱。為太陽之寒所持。於是熱鬱而有口苦咽乾。腹滿微喘之證。太陽寒在表。於是重複發熱惡寒。



下後之腹滿。正氣虛而邪氣乘虛而入。證之腹滿。僅為陽虛所乘。者。而難去矣。

脈浮而緊也。風盛氣壅。大便縱難。實非下。逆下之。則病在陽明。太陽之經者。繫及陽明。太陽之府。故腹滿。小便難。以外邪乘虛內陷。而津液且亡也。邪到陽明。已為萬物所歸。重受表邪。則所歸之氣。俱從陽明。傳胃所以三陽之證。俱見。其問腹滿。一證兼屬太陰。藏受府氣。而為熱滿也。腹滿則大便必難。故以下為戒。或謂此條與太陽大青龍證同。太陽以風寒持其營衛。故有煩躁證。而無腹滿證。此以風寒持住陽明。故有腹滿證。而無煩躁證。然口苦咽乾而喘。實與煩躁同其機兆也。

陽明病、脉浮而緊、咽燥、口苦、腹滿而喘、發熱、汗出不  
惡寒、反惡熱、身重、若發汗、則燥、心煩憤、反譫語、若加  
燒針、必怵惕煩躁不得眠、若下之、則胃中空虛、客氣  
動、脇心中懊憹、舌上胎者、梔子豉湯主之、若渴欲飲  
水、口乾舌燥者、白虎加人參湯主之、若脉浮發熱渴  
欲飲水、小便不利者、猪苓湯主之、陽明病、汗出多  
而渴者、不可與猪苓湯、以汗多胃中燥、猪苓湯復利  
其小便故也、

前條有發熱  
惡寒六經曰

發熱以上與前同而汗出不惡寒反惡熱身重則  
皆陽明之見證蓋以陽明之經氣較盛則乍到之

陽明中風此  
條不惡寒反  
惡熱故曰陽  
明病

脈洪可汗  
則不可汗  
證可下脈則  
不可下加以  
相傳口苦腹  
滿而喘便後  
三陽合病溫  
針益壯火而  
清陰矣故三  
治俱為犯經

表。和。不。能。敵。其。熱。熱。多。寒。少。故。亦。有。不。惡。寒。反。惡。  
熱。者。其。實。與。前。同。其。感。受。也。治。宜。雙。解。用。及。辛。寒。  
之。劑。單。表。單。裏。俱。不。可。故。著。汗。下。燒。針。之。逆。以。示。  
禁。汗。則。胃。實。燒。針。則。損。陰。下。則。胃。虛。邪。客。證。因。誤。  
治。而。變。壞。難。為。一。定。之。法。故。有。梔。子。豉。等。湯。之。不。  
同。所。謂。視。其。脈。證。知。犯。何。逆。以。法。治。之。也。熱。在。上。  
焦。故。用。梔。子。豉。湯。熱。在。中。焦。故。用。白。虎。加。人。參。湯。  
熱。在。下。焦。故。用。豬。苓。湯。寒。邪。閉。熱。在。經。傷。氣。耗。津。  
必。甚。三。治。酌。量。只。是。趨。涼。避。熱。化。氣。回。津。以。無。惡。  
寒。證。卽。緊。脈。不。須。照。顧。也。汗。多。胃。中。燥。甚。陽。明。裏。

證已成者言猪苓湯之治與太陽五苓散頗同在  
太陽爲寒水氣化不遑桂朮者從寒也在陽明爲  
燥土氣化改桂朮爲滑石阿膠者從燥也處方至  
此已屬精微。若復以利小便爲暴液亡汗者禁則  
知證在陽明。兢兢以保津液爲第一義矣。

陽明中風。脈弦汗大而短氣。腹都滿。脇下及心痛。久  
按之氣不通。鼻乾。不得汗。嗜臥。一身及面目悉黃。小  
便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不解。病  
過十日。脈續汗者。與小柴胡湯。脈但浮。無餘證者。與  
麻黃湯。若不尿。腹滿。加噦者。不治。

此條蓋以不得汗三字為主。蓋以然兩字。謂氣重身。情鬱不得汗。微出不得出。欲入不得入。絡理澁。無所不至。竟無宜泄處。故見症如此。刺法從經中泄其熱耳。其脈邪被縛者。固未去也。故針而發之。乃酌量于柴胡麻黃二湯間。以通其久閉。為是得汗。

此條所中之氣。兼有溫邪在內。故脈弦浮大。裏陽為表陽閉遏。萬物所歸之經氣。阻塞不通。拂之極。則擾之極。故卒難用治。唯照依內經刺熱篇中之刺法。泄去其熱。此刺不專為耳。腫設小差。外不解者。內勢漸殺。所不解者。外不得汗。仍潮熱耳。猶須俟過十日者。恐小差之熱勢去之未盡。不無因升發之藥而復盈也。脈緒浮者。尚接弦大之浮。熱未能盡去也。故用小柴胡湯。變解之。脈但浮者。減去弦大之浮。不得汗之外。無餘證也。故用麻黃獨表之。不尿腹滿加噦。俱指刺後言。非指用柴胡麻黃。

耳

不家初滿加  
燒胃氣已竭  
而三焦不復  
流通邪氣無  
出路矣

後言刺之而諸證小差唯此不差。蓋且有加。以府  
熱已經攻。藏而破氣。垂亡不治之勢。已成。雖小柴  
胡湯。麻黃湯。不必用矣。此證之用麻黃湯。頗同太  
陽篇中陽氣重。故主一條之麻黃湯。彼用之於解  
血後。此用之於刺血後。皆是熱已出。而汗尚未得  
耳。

陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠。睡目合。則汗

外。此則有三陽合病之證。陽明居中土也。萬物所  
歸。大為陽明主。厥太陽以其脈合。故浮大。上關上。  
從關部連上寸口也。少陽以其證合。故但欲眠。睡

目合則汗。但欲眠為臍熱。盜汗為半表裏也。此條原論八少陽篇配入下條。當是有汗則主白虎。無汗則主小柴胡湯也。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁。面垢。讞語遺尿。發汗則讞語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗者。白虎湯主之。

三陽合病。但見發熱。汗自出。不仁。讞語者。熱淫布胃。氣滿。讞昏也。此是陽明主證。而少陽之合。則見面垢。證風木動而塵棲也。太陽之合。則見遺尿。證膀胱熱而不守也。凡陽證者。合則為麻黃。

湯證與至干  
陽明少陽合  
病而有大小  
氣湯證者以  
其中無太陽  
故又可酌其  
順而為下法

陰必虛而熱盛者氣更傷汗則傷氣譏語者胃愈  
涸也下則傷陰額上生汗者陽無依而上越也手  
足逆冷者陰被奪而熱深厥深也內燥外寒坐脈  
將絕血不內守氣將安附危證成矣計唯化熱生  
津從陽分清回陰氣使氣清則液布固白虎湯之  
職也胃熱祛而肺金肅水亦觀自高原矣前證但  
可主之以譏治譏救若果津液已枯不復有汗白  
虎更難用也

陽明病發潮熱大便澀小便自可胸脇滿不去者小  
柴胡湯主之



王肯堂曰陽  
明為病以家  
寔也今便溺  
而身自汗出  
身自汗出  
不要家反惡  
也

外此雖太陽已罷而少陽忽爾攬入陽明者亦不  
可作陽明處治如得陽明病而發潮熱似乎胃實  
之微矣但胃實之潮大便必硬而小便自赤滋今  
太便溥小便自可是熱雖盛非入府之熱也再以  
胸脇微之凡糞溥者氣自降氣不降而胸脇滿明  
是本來剋土故陽明少陽之證兼見小柴胡湯主  
之升木即所以鬆土也

陽明病胸下硬滿不大便而嘔舌上白胎者可與小  
柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濇然而汗  
出解也

上焦不通則  
營衛不布而  
津液不得流  
通以發熱氣  
在中此胃氣  
不和之由也

腸下腹痛不  
通而白胎  
小柴胡湯  
其用小柴  
胡湯者以舌  
上白胎猶帶  
表寒故也若  
脈不清而猶

前證不但大便澀爲未實即使不大便而却與腸  
下。澀。滿。之。證。兼。見。則。非。閤。下。焦。之。不。通。也。緣。木。氣  
鬱。於。土。中。不。能。升。發。是。爲。上。焦。不。通。上。焦。不。通。則  
氣。不。下。降。故。不。但。滿。而。且。嘔。上。焦。既。窒。則。津。液。爲  
熱。搏。結。徒。熏。蒸。于。腸。上。不。得。下。滋。于。胃。府。故。舌。上  
白。胎。而。不。大。便。白。胎。雖。不。遠。于。寒。然。津。結。終。不。似  
寒。結。之。大。滑。推。其。原。只。因。上。焦。不。通。夫。不。通。屬。下  
焦。者。從。導。不。通。屬。上。焦。者。從。升。小。柴。胡。湯。主。之。達  
土。中。之。水。而。順。其。性。使。上。焦。得。通。則。津。液。得。下。胃  
氣。因。和。諸。證。皆。愈。矣。上。焦。得。通。照。腸。下。澀。滿。言。津

則所謂舌上  
乾燥而煩飲  
飲水致升之  
則法已甚及  
津液此場不  
可主矣

液得下。照舌胎與嘔言。胃氣因和。照不大。便言因。  
字宜看。見陽明病。不必治陽明。而陽明無不可因。  
之治也。身濈然汗出者。陽明病多汗。室則汗不得。  
越一通之。而津液不窒。自能出布矣。○上條陽明  
病。從潮熱上見。此條陽明病。從不大便上見。  
陽明病。心下硬滿者。不可攻之。攻之利遂不止者。死。  
利止者愈。

從前諸證。非兼太陽。卽兼少陽。陽明更證未具。故  
不必戒攻。而只隨證施治。可得其條目。至若攻勢。  
雖具有不可攻者。尤不妨歷歷指之。純見陽明病。

胃邪者上中  
濕火不下行  
則上蒸也

三言

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。

至若心煩較之微煩者似劇。然未吐未下。則津液無傷。因不更衣而胃邪上壅。非不足之煩。有懊憹反覆顛倒之象。則調胃即是調心。曰可與調胃承氣湯。見與之亦無碍也。

三言

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚微煩。不了了者。此大便必鞭故也。以亡津液。胃中乾燥。故令大便秘。當問其小便日幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液當還入胃中。故知不久必大便也。

汗與小便皆胃汁所釀盛于外者必竭于中凡陽  
明病必多汗及小便利必大便鞭者職此重發陽  
明汗必併病之陽明也所以病雖差尚微煩不  
了所以然者大便鞭故也大便秘者亡津液胃中  
乾燥故也此由胃氣失潤非關病邪胃無邪搏津  
液當自復故第問其小便日幾行耳本小便日三  
四行指重發汗時言今日再行指尚微煩不了了  
時言觀一尚字知未差前病尚多今微利此未脫  
然耳故祇須靜以俟津液之自還蓋攻之一字與  
病相當是奪燥氣以還津液稍不相當卽是奪津

設以增燥氣。故知燥氣有邪。燥胃燥之不同。若二  
源俱未全。而誤行攻法。則滋溼生寒。陰邪來犯。害  
益難言矣。

陽明病自汗出。若發汗。小便自利者。此爲津液內竭。  
雖硬不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若  
土瓜根及與大猪膽汁。皆可爲導。

此與上條同意。總無病邪故也。小便自利者。津液  
未肯還入胃中也。津液內竭而硬。故自欲大便。但  
苦不能出耳。須其有此光景時。方可從外導法。導  
潤其腸。腸潤則水流就溼。津液自歸而還胃。故不

但大便通而小便亦從內轉矣。蓋與土瓜根大黃  
 膽汁皆可者。勢以其便無煩難也。二條總無胃熱  
 證。故雖小承氣。調胃承氣。俱在所禁。

得病二三日。麻黃無大陽柴胡證。煩躁。心下鬱。至六  
 五日。雖能食。以小承氣湯。少少與和之。令小安。至六  
 日。與承氣湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不  
 能食。但初頭硬。後必溏。未定成硬。攻之必溏。須小便  
 利。尿定硬。乃可攻之。宜大承氣湯。

過此以下。皆其已屬胃實證。而用大承氣湯者。顧  
 大承氣非輕用之劑。而用之尤不可以無法。故不

特其證宜審而其脉尤宜審得病二三日指不大  
便言弱者大而弱也病進矣而脉不進腸胃強燥  
而血自少也雖表邪盡去無大陽柴胡證裏邪告  
急有煩躁心下梗證正不可恣意于攻之一字也  
此句以上截作一頭下面分作兩脚能食者以結  
在腸間而胃火自盛也先以小承氣湯少少與之  
和胃中之火令少安後以前湯增至一升去腸中  
之結既是小承氣矣而又減去分數接續投之以  
弱脉之胃稟素虛而為日又未久也然而何不需  
之四五日後以小便已利不必需也若前證不大



便六七日小便總是不利則腸雖結而胃弱不能  
布水水漬胃中故不能食非閼燥屎在胃不能食  
也攻之雖去得腸胃之結早已動及胃中之水鞭  
反成滯矣須小便利者先行滲法也水去而硬乃  
定故可攻以大承氣湯其不用小承氣湯者以爲  
日已久弱脈不可久羈也

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿  
而喘有潮熱者此外欲解可攻也手足濇然而汗  
出者此大便已硬也大承氣湯主之若汗多微發熱  
惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大

身重者脾  
有所阻也表  
裏邪盛皆能  
令邪勝則

邪氣在表面  
陽者滿或注  
胸而不有腹  
此則腹滿而  
邪知外注解  
可攻裏也

滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄下。  
遲者。大而遲。其人素稟多陰也。故雖汗出。不惡寒。  
其身必重。必短氣。必腹滿而喘。經脈濡滯。不能如  
陽脈之迅利。莫阻也。故邪雖離表。仍逗留不肯遽  
入裏。直待有潮熱。方得外欲解。不然。則身重短  
氣。腹滿而喘之證。仍筭外。不筭裏。在他人只潮熱  
證。便可攻。而脈遲者。必待手足濇然汗出。此時陽  
氣大勝。方是大便已鞭。方可主以大承氣湯。此脈  
不用小承氣者。以裏證備具。非大承氣不能伏其  
邪耳。若汗雖多。而只微發熱。惡寒。即不敢攻。即不

惡寒而熱未潮亦不敢攻蓋脉遲則行遲入裏頗  
艱雖腹大滿不通勢急矣熱尚未全聚雖滿而  
不甚結只可用小承氣湯勿令大泄下總因一遲  
字遂爾斟酌如此觀遲字下雖字可見然遲脉亦  
有邪聚熱結腹滿胃實阻住經隧而成者又不可  
不知

陽明病譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因  
與承氣湯一升腹中轉矢氣更服一升若不轉矢氣  
勿更與之明日不大便脉反微弱者裏虛也爲難治  
不可更與承氣湯也

胃實脉以實大爲正。苟非實大。便須斟酌。不但弱  
與遲也。又如一陽明病。已見譫語。胃火乘心可知。  
兼發潮熱。邪盛而正衰。乘旺方敢與爭。可知脉復  
滑而疾。非弱遲尚帶虛帶寒可知。當從胃家實治。  
誰不曰宜。不知滑疾雖陽盛之診。然流利不定。終  
未着實。主以小承氣湯。尚在試法之列。果轉矢氣。  
則知腸中有結屎。因劑小米能遽下。所下者屎之  
氣耳。不妨更服以促之。若不轉矢氣。并不大便。則  
胃中無物。可知微爲陽虛。微爲液竭。脉反變此則  
前之滑疾。乃虛陽之上之假象。而今之微纖。乃裏

氣大虛之真形。其陽明病屬津液竭而閉。誤謂屬  
虛陽不能自安而鄭聲潮熱屬陽微僅得乘旺而  
暫現。正虛則邪愈實難治者。此證須是補虛滋液  
以回陽氣。而苦寒留中無從布氣。須先泄去其藥  
方可施治。無奈正氣已虛。又不可更與承氣湯也。  
陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯。不硬者不  
可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與  
小承氣湯。湯入腹中轉矢氣者。此有燥屎。乃可攻之。  
若不轉矢氣。此但初頭鞭後必泄。不可攻之。攻之必  
脹滿不能食也。欲飲水者與水則噦。其後發熱者必

氣動則知俱  
 有自陽明脉  
 六日字升以

嘉興論後條約

胃不寒而攻  
之下燥未除  
中氣復起矣

傷胃故脹滿不飲食燥故欲飲水虛故與水則嘔  
其後發熱者熱從燥氣復也未發熱之前禁不得  
大便可知大便雖因胃復而再秘腸胃反因下虛  
而愈燥故仍和以小承氣湯末二句乃特從前失  
慎之意

陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹  
微滿初頭顛後必漉不可攻之若有燥屎者宜大承  
氣湯

陽明病下之承上條言未得欲知之法輒用大承  
氣湯也下之的當和應伏矣若心中懊懣而煩者

無燥味者不  
得久氣也亦  
屬乾子或湯  
冷

此有二因。又須斟酌。其轉久氣者。有燥屎也。只因  
燥屎去之未盡。今則欲行不能行而攪作。再用大  
承氣湯。以協濟前藥。則為康下而辟煩解。若腹微  
滿。不轉久氣者。此乃虛氣上逆而煩蒸。山前未欲  
知之。誤也。初發後泄。攻之必不能食。而飲水則嘔  
矣。急止勿服。未旬乃中。可攻。句以決治意。此三條  
一反一覆。見不可不行。欲知法。

病人不大便五六日。繞臍痛。煩躁發作有時者。此有  
燥屎。故使不大便也。

卽此而推及凡病。攻法必待有燥屎。方不為誤攻。



則所以驗燥屎之法不可不脩求之無恃轉矢氣之一端也病人雖不大便五六日尿燥未溲未可知也但使繞臍痛則知腸胃乾屎無去路故滯澀在一處而作氣煩燥發作有時因尿氣攻動則煩躁發作攻動究不能去則又有時伏而不動煩躁此時亦不作以此徵之從有尿尿所其不大便當無差矣何大承氣湯之不可致也

天下後六七日不大便腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯又卽此而推之不獨未下可用大承氣卽大下之

下後亡津液  
此令不大  
便成煩不解  
時通滿不解

音  
尤

雖多滿重以

後。不。妨。重。用。之。也。以。有。六。七。日。不。大。便。煩。不。解。腹。  
滿。痛。之。證。乃。燥。屎。之。明。徵。也。煩。不。解。指。大。下。後。之。  
證。腹。滿。痛。指。六。七。日。不。大。便。後。之。證。從。前。宿。食。結。  
大。下。而。棲。泊。於。迴。腸。曲。折。之。處。胃。中。尚。有。此。故。煩。  
不。解。久。則。宿。食。結。成。燥。屎。指。住。去。路。新。食。之。濁。糞。  
總。畜。於。腹。故。滿。痛。

病。人。小。便。不。利。大。便。乍。難。乍。易。時。有。微。熱。喘。冒。不。得。  
臥。者。有。燥。屎。也。宜。大。承。氣。湯。

更。卽。此。而。推。及。之。不。特。不。大。便。宜。用。大。承。氣。卽。大。  
便。乍。難。乍。易。亦。不。妨。于。用。之。也。燥。屎。阻。住。經。輸。故。

傷寒論後條辨

卷七

二十七

小便不利。非津液偏滲者比也。小便不利。故大便  
乍難乍易。易者。新尿得潤而流利。難者。燥屎不動  
而阻留。況時有微熱。喘冒不得臥。莫非燥屎之明  
徵也。尿燥。胃乾。三焦不通。而發熱。非陽明和盛之  
熱。故微濁。氣乘肺。故喘。濁氣乘心。故冒。胃者。昏  
也。濁氣乘膽。故不得臥。總是尿氣不下行。上擾乎  
清道也。時有者。動則有。伏則不有也。可見無燥屎  
雖不更衣。十日無所遺。尿不必盡。不大便。而  
可下。下不下。可不謂求其訣乎。

三言

陽明病。譫語。有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五

六枚也。若能食者，但輕耳。大承氣湯下之。

從前驗燥屎之法，不必盡屬陽明。陽明病，驗燥屎之法，匪一轉天氣則外。若譫語，若潮熱，皆必有燥屎而後可下。平日是不然。二證果兼，則不能食者，胃中必有燥屎五六枚，宜大承氣湯下之。即能食者，但輕亦大承氣湯下之。如前條所云陽明病潮熱，大便微硬者，可與大承氣湯，是也。蓋維病在下，其結陽明病在下，其熱結亦能成實，不必屎結而實也。

夫實則譫語，虛則鄭聲，鄭聲重語也。

內經曰：「諸虛百損，皆由氣虛。」也。又難經曰：「脈滑而疾者，獨非其證乎？」何以一誤於小承氣，即為難治。此則實虛二字，不可不講耳。緣潮熱一證，自有表裏之分，尚易辨別。若兼微語，則微語一證，有大實，亦有大虛。實者，設與脈俱實，其發則名微語虛者，證雖實而脈虛，其發則名鄭聲。鄭聲與微語無異，以亂雅得名耳。其實鄭聲即微語之複辭也。疑似之間，最難顯微。證脈合參之，可下不可下，只在虛實二字取決。又不必泥定有燥屎無燥屎也。以後只言微語，不言鄭聲，欲人于虛實內

潮熱微語雖可下，則前條有所云微語發潮熱，脈滑而疾者，獨非其證乎？何以一誤於小承氣，即為難治。此則實虛二字，不可不講耳。緣潮熱一證，自有表裏之分，尚易辨別。若兼微語，則微語一證，有大實，亦有大虛。實者，設與脈俱實，其發則名微語虛者，證雖實而脈虛，其發則名鄭聲。鄭聲與微語無異，以亂雅得名耳。其實鄭聲即微語之複辭也。疑似之間，最難顯微。證脈合參之，可下不可下，只在虛實二字取決。又不必泥定有燥屎無燥屎也。以後只言微語，不言鄭聲，欲人于虛實內

直視譫語者  
非死證即帶  
微生亦有一  
條  
此兼指陽氣  
下利則氣  
脫而難知矣

三言

八言

直視

辯譫語。卽于譫語內辨鄭聲。聲語間無甚歧異也。

直視。譫語喘滿者死。下利者亦死。

然則辯譫語者。須辨其有知。直視譫語。人皆以爲陽熱證矣。然而神散則亂。亦令直視兼譫語。而見加以喘滿者。必從誤汗得來。故氣從上脫而死。加以下利者。必從誤下得來。故氣從下脫而亦死。此證之虛實宜辨也。

發汗多。若重發汗者。亡其陽。譫語脉短者死。脉自和者不死。

辯譫語者。尤宜辨其脉。發汗多之人。其陽已虛。可

和字對短  
字言猶未失  
陽明之長大  
脈也不死者  
尚得同下條  
津液外出胃  
中便變一詞

二頁  
八四

此  
實字即引家  
在之宜字引  
不寔便作虛  
看和景已立  
柴胡桂枝湯  
以和榮衛通  
津液為詞矣

知重發汗而亡其陽。陽神無主。故譫語。脈短者死。  
陰來促陽也。脈自和者不死。陽絕于裡而氣猶未  
脫也。以譫汗而成譫語。即有短脈之死。若譫汗譫  
語斷無和脈之不死。可知此脈之虛實宜辨也。  
陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必硬。硬  
則譫語。小承氣湯主之。若一服譫語止。更莫後服。  
譫語能從脈證間辨其虛則實。和似可無慮。然虛  
家之譫語。固曰亡陽。實家之譫語。亦因亡液。以亡  
津液而得譫語。則胃燥之譫語。與胃實之譫語。救  
法雖同。而緩急微甚之間。承氣不無譏大小矣。陽

惟之難治  
按此皆同有  
邪聲之私真  
處只前此一  
條可以詳矣

喘而喘滿為  
純裏入之喘  
滿在上也  
特以脈沉所  
為在裏

三五

明病法多汗其人又屬汗家則不必發其汗而津液外出自致胃燥便硬而譫語證在虛實之間故雖小承氣湯亦只一服為率譫語止更莫後服者雖燥硬未全除輒于實處防虛也

傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津

液越出大便為難表虛裏實久則譫語

傷寒四五日脈沉而喘滿沉者大面沉也雖喘滿

尚帶三分表證然沉脈已為在裏宜從併病例小

發其汗而反正發其汗以致津液越出大便為難

當時未必譫語迨喘滿去而表虛大便難而成實



公

久則譫語矣。夫實則譫語，自是大承氣湯證，而乃  
缺其治者，以此實從帶表而來，尚有微甚之鬱，酌  
也。

汗出譫語者，以有燥屎在胃中，此為風也，須下之，通  
經乃可下之。下之若早，語言必亂，以表虛裏實故也。  
下之則愈，宜大承氣湯。

譫語必因汗後，胃中已燥而成。此于汗出之時，即  
挾譫語而來。此係胃風，證在胃中，先經耗液，已  
成燥屎，後乃見之於表，而見汗出證，故汗出即譫  
語，以表虛裏實故也。句宜安在，乃可下之。句下燥

胃風之汗，非  
引蒸之汗，而  
風邪之汗，此  
處之燥屎，非  
熱結而風燥

胃中不和  
謂風家也  
須知經乃可  
下之

八七

屎須下。風家須過經乃下。所以然者。待表虛裏實。故也。表虛者。表罷之謂。下之若早。語言必亂。裏氣虛而譫語。變為鄭聲矣。之則愈宜。大承氣湯見。過經即不難放手也。

傷寒若吐若下後。不能不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。微瀉並視。脈弦者。生者死。微者。但發熱譫語者。大承氣湯主之。若一服利止。後服。

傷寒若吐若下後。津液亡而邪未去盡。故不解。燥

名曰若下後  
不解由其人  
氣亦在胃而  
成燥未經發  
汗難以不待  
過經即下李  
治暴亡風燥  
之病中者按  
銅鐸及胃陽  
且以陰光竭  
矣故一發汗  
變而成危候

二百八

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯  
氣從邪反結為實故不大便五六日上至十餘日  
從前宜再用大承氣湯蕩盡邪燥以安津液法不  
出此胃氣生熱其陽則絕陽絕者無餘也以和之  
也故諸所見證莫非陽亢陰絕孤陽無依而擾亂  
之象弦濇皆陰脈弦脈循帶長甚濇脈已成涸竭  
生死以此斷之微者但發熱譫語仍是邪燥結實  
而已陰未全竭大承氣湯主之所以去燥結也燥  
結去陰氣自復故利利再服則通陰者大承氣  
而奪陰者即大承氣故止後服伯無汗故為亡陽

此等之下皆  
為救陰而發  
不在發寒  
症之下可經  
攻冷之下不  
可也  
下利不可發  
五定發日五  
定有死二百  
八九  
乘虛而發于  
此已的故須  
急下

牛音

大承氣湯雖有去實滿去燥熱之不同總之為發  
津液而設則緩急之勢亦宜視津液而斟酌矣陽  
明病有身熱證無發熱證發熱而復汗多陽氣大  
蒸於外虛陰液耗于中雖無內實之兼證宜急  
下之以大承氣湯矣

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

發汗不解津液已經外奪腹滿痛者胃熱遂爾迅  
攻和陽盛寔而瀰漫不急下之熱勢要蒸糜爛速  
及腸胃矣陰虛不任陽填也

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

九二

因邪勢盛實故雖下之而腹滿如故即減去一二  
分算不得減下之不妨再下雖不在急亦當減盡  
乃為真陰得復陽邪不至再集耳

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難  
身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

此與脈浮而  
沉脈浮而沉  
一條脈者其  
皆陽虛之病  
是而平去之  
陰虛致之此  
以證發後以  
脉驗  
日中不了了  
精不和者陰

前兩證急下者以其勢之急故下之急不知勢之  
緩亦有下之不得不急者如目中不了了睛不和  
一證是也緣目與睛管胃中之水六七日見此  
知腎中真水為胃陽所吸竭者非一旦夕矣雖外  
無陽熱證內無輒滿脹滿證只是大便難身微熱

氣の奔也

病有只據口  
下不據從前  
者必詳前證  
證與時方例  
同此

三十一

三十二

按此更斷為實也。若非急下，則津枯于胃，藏較前  
條之津越于外，津結于內者，更難復以土之剋水  
是為賊也。陽明病之熱，緩腎病急矣。

陽明病，太陽證罷，但發潮熱，手足濇然，汗出，大便  
難而微，此下之則愈。宜大承氣湯。

外此則有二陽併病之證。雖前此尚兼太陽，今則  
太陽證罷而已。盡併陽明，成胃實證。大承氣湯下  
之，無迫議矣。

陽明少陽合病，必下利。其脈不負者順也，負者失也。  
互相剋賊，名為負也。脈滑而數者，有宿食也，當下之。

宜大承氣湯

外此則有陽明少陽合病之證必見下利以土中  
 乘木疏泄之令妄行于陽明也見消數之脈為不  
 負為順見弦直之脈為負為失以證已下利而脈  
 中更見木邪證脈互相剋賊胃氣虛而上敗故名  
 為負若見消數是為水穀有餘之診緣食入于胃  
 散精于肝淫氣於筋上邪盛而無木制反不能輸  
 化水穀以致宿食留中因通用宜大承氣湯平  
 其敦阜矣

各音

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下

滑為陽瘕之  
 診陰字只當  
 細字看

之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫  
以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反  
和者此爲內實也調胃承氣湯主之

下利可下并可因此而例及過經不解之證矣譌  
語爲胃實不應下利下利爲虛脉不應調和今皆  
互而有之知未下利之先胃有其實熱也胃熱則  
屎燥當以湯盪除其熱爲合法若未下以湯亦只  
有譌語證何至小便利大便當鞭而反下利下利  
而脉復調和調和對下微字看仍陽明如經之大  
脉也脉證不協知醫下以丸藥下焦之閉隔徒虛



九經論  
必宜  
必宜

三百  
九

胃中之燥屎仍在。所以下利兼見譫語。顧下利譫語亦有亡陽而屬虛寒者。要之脉微肢厥可辨。今反和而如經。知液以下利而愈乾。屎以液乾而愈燥。邪熱斂內而為實無疑也。雖屬大承氣湯證。而關關已傷。只宜和以調胃承氣湯耳。

脉陽微而汗出少者為自和也。汗出多者為太過。陽脉實因發其汗出多者亦為太過。太過為陽絕於裏。亡津液大便因硬也。

合而論之。三陽明證皆由胃家實得之。而其來路實始于太陽。則病在太陽。便宜為三陽明家惜。及

陽絕於裏者  
絡從中起陽  
氣閉絕於內  
而不下通也  
下條其陽則  
絕同此

浮北爲亡血  
夫精診中寒  
故也茲以有  
陽絕陰而見  
空治宜宜作  
陽以治火火  
陽以治生而  
精與前條  
脈寬大俱因

津液矣。胃家實者。其人納多出少。毋論陽。肝欲陽。脈實俱以汗出少爲自和。汗出多爲太過。陽絕于裏者。孤陽獨治。無陰液以和之。大便因鞅而成。內實證則不得不用大承氣湯矣。答在過亡津液也。脈浮而芤。浮爲陽。芤爲陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

若發汗利小便。已。胃中燥。煩熱。大便難者。其人血液素少。一遇傷寒。脈浮而芤矣。浮爲陽。陽盛于外。芤爲陰。陰空于中。二脈互結。胃氣生熱。而有不更衣之證。其陽則絕者。陽氣自成。阻絕陰氣。不得通。

要行與者。  
胃氣生熱此  
為正熱。

脾約者。脾陰  
外溢。無液以  
滋脾家。生自  
乾。約。下。何能  
以。陰。陰。陰。及  
陽。胃。所以。謂  
火。盛。而。腸。枯  
大便。堅。而。在  
粒。小。也。取。仁  
九。寬。腸。潤。燥  
以。其。其。其。欲  
使。脾。陰。從。內  
生。耳。

傷寒論後條辨

亦曰胃家實也。

跌陽脉浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則難。其名爲約。麻仁丸主之。

至于脾約家。則跌陽脉浮而濇。其常也。浮則胃氣強。濇則小便數。火盛水虧。由二脉相搏而致大便難之證。此之謂約。麻仁丸潤燥通幽爲處治。則一遇傷寒。其不能恣行大承氣可知矣。所以然者。以其爲太陽陽明。非正陽明。胃家實者。比則推之。少陽陽明。其不可以正陽陽明胃家實之治治之。不可例推乎。○陽明脉大。大而實也。不實而芤而

○濟○由○其○胃○中○先○有○所○亡○經○曰○陰○虛○者○陽○必○衰○故○二○  
○家○之○轉○屬○陽○明○反○易○急○○陽○救○陰○又○不○可○泥○定○  
○陽○明○脉○大○之○說○緩○彼○如○焚○之○救○也○

傷寒論後條辨卷之八

新安程應旌郊信甫作註

辨陽明脈證篇第二

陽明府病有熱無寒陽明經病寒熱互具。其寒也。非太陽之寒。太陽之寒。鬱卽成熱。此則胃中虛冷所致。無轉熱證也。其熱也。亦非太陽之熱。太陽之熱。能卽入裏。此則瘀熱在裏。不能亦不入也。故雖有中風中寒之名。總非營衛受邪。寒熱實虛之間。自本乎中氣。故特以能食不能食辨病因。雖有潮熱盜汗證。皆不作裏實。推潮熱則同三陰治例。

四逆湯。吳茱萸湯可用。熱則隨證定法。以和解。與不在攻下之例。一破世人按日求麻。據熱議攻之誤。故於末二條。特示所戒。所法焉。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。

陽明府病。歸一之病也。只須來路清楚。縱不清楚。自現表證。統曰帶表而已。陽明經病。不一之病也。前不必有所傳。後不復有所歸。在表既無頭痛惡寒證。則非太陽之表在。又無燥堅裏實證。則非非陽明之裏錯。綜之邪從何辨之。辨之於本因之寒熱耳。本因有熱。則陽邪應之。陽化較故能食。就

有太陽證二  
脉白熱以本

論中風證中  
之病也

能食者名之曰中風。猶云熱則生風。其實乃病熱。  
在裏證也。本因有寒則陰邪應之。陰不化穀。故不  
能食。就不能食者名之曰中寒。猶云寒則召寒。其  
實乃胃中虛冷證也。寒熱於此辯。則胃氣之得中  
與失過於此驗。非教人於能食不能食處辯及中  
風中寒之來路也。

陽明病。脉浮而緊者。必潮熱發作有時。但浮必盜汗  
出。

以能食不能食辨風寒。固可得陽明經病寒熱虛  
實之大槩矣。猶恐證候狐疑。不無有經病罷尤勝

病之處則更須從脉辨之。如既云陽明病自汗出而惡熱者不可與桂枝湯。陽寒傷營風傷衛之表證可知。何至有汗而惡寒。但浮之表脉也。其脉浮而緊者。緣裏伏陰寒。擊陽於外故也。陰盛陽不敢爭。逆乘旺時而一爭。故潮熱發作有時也。但浮者胃陽虛而中氣失守也。脈則陰氣盛陽益不能入而盜汗出也。未潮熱汗出者。陽明裏實證而今屬之虛寒。則於其脉錯之。更不可互參及能食不能食。內法也。



腹滿下之可  
 去此則氣  
 不得宣洩  
 胃氣虛寒使  
 復下之益虛  
 其虛寒故腹  
 滿如故

脉證互參。則凡陽明經病之有虛寒。有瘕熱。可一  
 一指出之矣。如陽明病脉遲遲為寒。寒則不能宣  
 行胃氣。故非不能飽。特難用飽耳。飢時氣尚流通。  
 飽即填滯。以故上焦不行。而有微煩。頭眩證。下脫  
 不通。而有小便難。證。小便難中。包有腹滿證。在內。  
 欲作殺疸者。中焦升降失調。則水穀之氣不行。鬱  
 黷而成黃也。曰殺疸者。明非邪熱也。下之兼前後  
 部言。茵陳蒿湯。五苓散之類也。曰腹滿如故。則小  
 便仍難。而疸不得除。可知。再出脉遲。欲人從脉上  
 悟出胃中冷來。

此之手足濕  
汗出者小  
便不利所致  
水喘非胃熱  
也固癥者因  
而反為水氣

陽明病。若中寒不能食。小便不利。手足澹然汗出。此  
欲作固癥。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷。水  
穀不別故也。

胃中冷。小便難。能作穀疸。小便不利。亦能作固癥。  
穀疸雖腹滿不可攻。固癥雖大便鞭不可攻。又如  
陽明病。其人中氣素寒。則胃中寒氣。今且為經邪  
所蕤。既不能腐熟水穀。又不能宣行津液。故不能  
食。而小便不利。經中陽氣不能內達。自爾外蒸。故  
手足澹然汗出也。凡手足澹然汗出者。津液既越。  
大便必鞭。今雖鞭。只積寒而作固癥。津液不亡也。

所結其要必  
有方豈特以  
結在局為永  
結的結在胸  
為則則陰陽  
分其別在  
此

不能食之外  
無他證統以  
攻其為戒幸  
世人勿以胃  
火二字誤加  
陽明也

不待攻。而且初。鞭後。瀉。敢攻之乎。水穀不別。屬。溼。熱。偏。滲。者。多。此。點。出。胃。中。冷。飲。人。知。病。本。於。寒。宜。從。寒。治。不。在。利。小。便。也。

陽明病不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷。故也。以其人本虛。故攻其熱必噦。

能食不能食。可以辨人之中氣。則凡不能食者。統屬胃中虛冷之故。雖有陽明經分之熱。不可攻之矣。攻藥不遠寒。虛寒相搏。必噦。胃陽被傷。故也。本虛以平素言。熱以陽明病言。有本則凡病之來。雖有熱邪。俱宜標視之。陽明且然。他經益可例矣。

陽明病法多汗反無汗其  
身如蟲行皮中狀者此以  
久虛故也

陽明病法多汗反無汗其  
身如蟲行皮中狀者此以  
久虛故也

陽明病陽氣充盛之候也故法多汗今反無汗胃  
陽不足其人不能食可知蓋汗生于穀精陽氣所  
宣發也胃陽既虛不能透出肌表故怫鬱皮中如  
蟲行狀虛字指胃言兼有寒久字指未病時言

陽明病反無汗而小便利二三日欬而嘔手足厥者  
必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

陽明病反無汗陽虛不必言矣而小便利陽從下  
泄中證與溫積之稍久胃中獨治之寒厥逆上攻

故二三日欬而嘔手足厥一皆陰邪用事必苦頭痛者陰盛自干于陽其實與陽邪無涉頭痛者標欬嘔手足厥者本條中有一嘔字不能食可知食穀飲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

食穀飲嘔者納不能納之象屬胃氣虛寒不能消穀使下行也曰屬陽明者別其與少陽喜嘔之兼牛表太陽乾嘔不能食之屬表者不同溫中降逆爲主吳茱萸湯是其治也得湯反劇者寒盛格陽不能下達再與吳茱萸湯則愈曰屬上焦者不欲

人以此狐疑及中焦之陽明變易其治法耳。  
脉浮而遲、表熱裏寒、下利清穀者、四逆湯主之。若胃  
中虛冷、不能食者、飲水則嘔、若脉浮發熱、口乾鼻燥、  
能食者、則與。

合諸前條推之、凡屬中寒者、只宜溫在裏之寒、不  
宜顧在表之熱矣。但須以脉辨之、脉浮而遲、浮爲  
陽、知邪熱之蒸發在表、遲爲陰、知虛冷之伏陰在  
裏。但見下利清穀一證、雖病在陽明、不妨從三陰  
例、溫之以四逆湯矣。既已溫之、或有溫之不及、與  
溫之大過、則仍於能食不能食之間辨之。若胃中

開故欲飲水  
胃陽未復故  
痰、

脈浮發熱口  
乾身煩是從  
陽起陽中水  
出陽明近水  
從前飲水向  
足假陽明

虛冷未回自是不能食雖經熱得四逆轉增燥欲  
得水然水入為胃寒所擊氣逆則噦矣雖下利清  
穀止仍宜溫也若脈不遲但浮不但表熱更發熱  
裏寒已去可知口乾鼻燥經熱上升可知其人能  
食則胃陽已回必蛔蛔則解縱有不解稍用清涼  
蓋在太陽既有先溫其裏後攻其表之法則在陽  
明自應有先溫其裏後解其經之法矣  
陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若  
不欬者咽不痛

陽明以下行為順逆則上行故中寒則有頭痛證

或謂胃氣主  
喉氣上攻  
惡下流在胃  
家胃氣自熱  
亦皆能令欬  
母病及子也

中風則有頭眩證以不惡寒而能食知其鬱熱在裏也寒上攻能令欬其欬兼嘔故不能食而手足厥熱上攻亦令欬其欬不嘔故能食而咽痛以胃氣上通于肺而咽爲胃府之門也夫咽痛惟少陰有之今此以欬傷致痛若不欬則咽不痛况更有頭眩不惡寒以證之不難辨其爲陽明之鬱熱也陽明病初飲食小便反不利大便自調其人骨節疼痛翕翕如有熱狀奄然發狂譫然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈

陽明胃強祇成鬱熱卽有中寒亦從熱化而得解



在狀發狂  
狀汗出  
氣勝也

可○無○慮○也○初○欲○食○者○胃○氣○未○嘗○為○病○奪○也○小○便○雖○  
不○利○而○大○便○自○調○更○非○初○鞭○後○溇○者○比○緣○胃○中○不○  
冷○寒○不○能○中○而○只○在○經○絡○間○故○脉○不○遲○反○緊○若○其○  
人○骨○節○煩○疼○翕○翕○如○有○熱○狀○奄○忽○發○狂○者○此○則○經○  
絡○間○之○寒○邪○將○欲○還○表○而○作○汗○故○先○見○鬱○蒸○之○象○  
也○水○以○小○便○言○發○氣○以○欲○食○言○前○此○水○與○寒○併○故○  
小○便○不○利○其○人○殺○氣○現○強○水○不○能○勝○當○併○出○於○汗○  
得○汗○則○寒○自○解○曰○脉○緊○則○愈○者○言○脉○緊○者○得○此○則○  
愈○也○

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗

出身無汗。躄頭而還。小便不利。渴飲水漿者。此爲瘧熱在裏。身必發黃。茵陳蒿湯主之。

外此則陽明更多鬱熱證。但責以汗出不徹。與汗多入裏之熱不同。俱不妨隨證定治也。發熱汗出。此爲熱越。有二證。一則病人煩熱。汗出則解是也。二則津液越出。大便爲難是也。俱非發黃證。今則頭汗出。身無汗。躄頭而還。足微陽熱之氣鬱結於內而不得越。故但上蒸于頭。頭爲諸陽之首。故也。氣不下達。故小便不利。府氣過燥。故渴飲水漿。瘧熱在裏。指無汗言。無汗而小便利者。屬寒。無汗而

小便不利者屬溼熱兩邪交鬱不能宣泄故會而發黃解熱除鬱無如茵陳梔子清上大黃導下通身之熱得泄何黃之不散也

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

可見熱不越則停溼溼者水氣也水得熱而乘心故心中懊憹土鬱不宜足微矣身必發黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

被火則土遭火逼氣蒸而炎上益甚汗僅微見於額上津液被束無復外布與下滲矣溼熱交蒸必發黃二證雖水有火攻不同然皆瘵熱在裏之因

表邪不盡陷  
入故外有熱  
外有熱者由  
胃家素無燥  
氣故雖病及  
陽明其不入

也。

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之。

陽明病熱已入裏手足不但溫而且濺然汗出方成下證若下之其外有熱手足溫自是誤下陽明之經病雖不同太陽誤下致邪陷入裏之結胃證却已同太陽誤下致陽擾及胃之心中懊憹證矣胃虛熱格故飢不能食熱鬱氣蒸故但頭汗出梔子豉湯吐之治無異於太陽之從高分也。

陽明病口燥但欲漱水不欲飲此必渴。

胃經者起於  
鼻。雖注而利  
於鼻。不能下  
注。則循經而  
上。而自鼻  
竅。不從口  
出。者。時時  
也。

外此則有衄血之證。陽明為多血之經。而其脉起  
於鼻。故熱甚則血妄行而由鼻出也。口燥者。口為  
胃竅。胃熱則燥也。漱水者。自欲解熱也。不欲嚥者。  
血得冷則凝。血已離經而自畏凝也。凡熱病得衄  
則解。誤以寒涼遏之。則變證反起。不可不知。  
陽明病。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。必有久瘀  
血。故令喜忘。屎雖鞭。大便反易。其色必黑。宜抵當湯  
下之。

外此則有畜血之證。太陽循經有畜血。陽明無血  
證。乃有病而喜忘者。其人素畜血。而今熱邪瘀之。

也。血。清。於。下。則。心。竅。易。塞。而。識。智。昏。故。不。識。則。狂。  
不。狂。則。忘。忘。字。包。有。妄。字。在。內。應。酬。問。答。必。失。常。  
也。病。屬。陽。明。故。尿。賴。血。與。糞。併。故。易。而。黑。張。隱。菴。  
曰。太。陽。之。氣。起。于。膀。胱。故。驗。其。小。便。陽。明。之。氣。本。  
於。腸。胃。故。驗。其。大。便。焉。不。用。桃。核。承。氣。湯。用。抵。當。  
湯。者。以。久。瘀。故。也。

陽。明。病。下。血。識。語。者。此。為。熱。入。血。室。但。頭。汗。出。者。利。  
期。門。隨。其。實。而。瀉。之。熾。然。汗。出。則。愈。

外。此。則。有。熱。入。血。室。之。證。蓋。下。血。則。經。脉。空。虛。熱。  
得。乘。虛。而。入。其。室。故。識。語。以。血。室。雖。衝。脉。所。屬。而。

經曰奪汗則  
無血而亡止  
則不可發汗  
故以刺法奪  
之

心○君○寶○血○室○之○主○人○也○室○欲○熱○擾○其○主○必○昏○但○頭  
汗○出○者○血○下○奪○則○無○汗○熱○上○擾○則○汗○蒸○也○刺○期○門  
者○熱○入○陰○分○實○在○陰○隨○其○實○而○瀉○之○則○榮○氣○和○而  
心○氣○下○通○故○澀○然○汗○出○而○解○

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假  
今已下脈數不解合熱則消穀善飢至六七日不大  
便者有瘀血也宜抵當湯若脈數不解而下利不止  
必協熱而便膿血也

可見陽明一經不繫府邪毋論寒證不可下即熱  
證亦不可下奈何今之醫者不然不論病人表裏

不。能。裏。全。未。全。但。見。發。熱。七。八。日。雖。脉。浮。數。者。以。  
爲。可。下。之。矣。不。知。發。熱。脉。浮。邪。渾。在。表。豈。可。計。日。  
妄。下。歟。一。下。而。變。證。各。出。脉。數。不。解。則。是。表。熱。與。  
膈。熱。相。合。上。焦。被。熱。勢。必。傳。爲。膈。消。而。成。消。渴。善。  
飢。之。證。若。六。七。日。不。大。便。熱。併。腸。胃。也。中。焦。結。燥。  
而。成。畜。血。抵。當。湯。之。證。若。脉。數。不。解。而。下。利。不。止。  
熱。侵。陰。分。也。下。焦。搏。溼。而。成。協。熱。便。膿。血。之。證。隨。  
其。熱。勢。所。至。而。變。證。紛。紜。若。此。究。其。由。來。豈。非。證。  
之。與。脉。不。加。詳。察。而。徒。計。日。誤。下。之。過。哉。

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽



須知陽明脈  
大四字是陽  
明病微始微  
其脈日凡錯  
其合皆足脈

明也。脈實者宜下之。脈浮虛者宜發汗。下之與大承  
氣湯發汗宜桂枝湯。

無已則舉一病以對勘之。使其知所誤而得取法  
焉。如病人煩熱已經汗解。視前條之發熱尚有表  
者不侔矣。又如瘧狀日脯所發熱視前條之全無  
裏證者不侔矣。據證已屬陽明下之可無誤下乎。  
雖然未也不可。不辯其脈。脈實則宜下。脈浮虛尚  
須汗。同一證而大承氣湯與桂枝湯之殊。其制如  
此。况脈浮數而發熱。則有表無裏。徒以六七日之  
故。而妄為可下。洎數善飢。諸變證層見叠出。誰之

此大字也  
大者大而足  
也

答哉。是知陽明一經有其來路。與其屬路。即在本  
經。更有其所病。與其經病。任經病中。又有其然。因  
與其寒。因毫釐千里。是所望于醫者。諦而又諦矣。  
故于篇末出此二條。使治陽明者。其亦知所禁。夫  
其亦知所法夫。

陽明病。欲解時。從申至戌上。

土所畏者水也。得申酉之金。子以復母仇。而戌土  
更旺。故解。